

華藝線上圖書館

方靜如 參考館員

成功大學醫學圖書分館

flora@ncku.edu.tw



更新日期：2023/11

2023/10/17 新版上線

功能可能會滾動式調整或短暫異常，請密切注意

新版網址 <https://www.airitilibrary.com>

舊版網址 <https://beta.airitilibrary.com>

首頁檢索模式：預設所有欄位 (含全文)，因此數量較海

(妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*) AND
(糖尿病 OR diabet*) AND
(身體活動 OR 運動 OR "physical activit*" OR exercise*)

Search



精確檢索：(妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*) AND (糖尿病 OR diabet*)



AND (身體活動 OR 運動 OR "physical activit*" OR exercise*)

2,597筆

主題瀏覽

登革熱病患的診

模糊檢索：(妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*) AND (糖尿病 OR diabet*)



AND (身體活動 OR 運動 OR "physical activit*" OR exercise*)

3,251筆

查詢出版品：(妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*) AND (糖尿病 OR diabet*)

推薦使用進階查詢 😊

Search



進階查詢

查詢歷史



主題瀏覽

登革熱病患的護理

進階查詢

文章篇名+關鍵字+摘要

妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*

AND

所有欄位

文章篇名

關鍵字

摘要

AND

文章篇名+關鍵字+摘要

出版品名稱

作者

指導教授

DOI

系所名稱

文章內文

文章篇名+關鍵字+摘要

糖尿病 OR diabet*

文章篇名+關鍵字+摘要

⊕ 加一行

⊖ 刪一行

身體活動 OR 運動 OR "physical activit*" OR exercicse*

- **文章篇名+關鍵字+摘要**：建議先使用此預設欄位
- **所有欄位**：包含文章內文(全文)，因此可能找到海量文章，除非結果過少再使用

進階查詢

文章篇名+關鍵字+摘要	妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestation* OR pregnan*	
AND	文章篇名+關鍵字+摘要	糖尿病 OR diabet*
AND	文章篇名+關鍵字+摘要	身體活動 OR 運動 OR "physical activit*" OR exercisce*

所有欄位

文章篇名

關鍵字

摘要

文章篇名+關鍵字+摘要

出版品名稱

作者

指導教授

DOI

系所名稱

文章內文

- **文章篇名+關鍵字+摘要**：建議先使用此預設欄位
(但英文字尾*切截可能出現錯誤訊息，請參考下頁方式處理)
- **所有欄位**：包含文章內文(全文)，因此可能找到海量文章，除非結果過少再使用

進階查詢

文章篇名+關鍵字+摘要

妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestational OR pregnant OR pregnancy

AND

文章篇名+關鍵字+摘要

糖尿病 OR diabetes OR diabetic

AND

文章篇名+關鍵字+摘要

身體活動 OR 運動 OR "physical activity" OR "physical activities" OR exercise OR exercises

⊕ 加一行

⊖ 刪一行

排序依照

 相關程度較高

每頁顯示

 10 筆

資料範圍

 僅顯示所屬單位館藏 (30)

限定條件

 排除無全文書目紀錄 (26)

文章類型

 期刊論文 (20) 學位論文 (10)

學科分類

 人文學 (1) 基礎與應用科學 (1)

(((ALL3)=(妊娠 OR 懷孕 OR 孕期 OR gestational OR pregnant OR pregnancy) AND [ALL3]=(糖尿病 OR diabetes OR diab



30 個查詢結果

 選擇全部

已選擇0筆

 ● 學位論文

臺灣剖腹產和妊娠期糖尿病與子代注意力不足過動症風險之相關性

李旻珊(Min-Shan Li)

臺灣大學公共衛生碩士學位學程學位論文 (2022) 碩士

背景：注意力不足過動症為常在兒童時期發生的神經心理疾病，目前有逐年增加趨勢，此疾病對於病童、家屬和社會造成的負面影響深遠。目的：過去文獻顯示：剖腹產和妊娠期糖尿病和子代注意力不足過動症生兒共137,020名，追蹤此研究族群至2016年為止是否曾被診斷為注意力不足過動症...

此區顯示檢索詞出現於全文區段之上下文，並非顯示摘要。
(將建議廠商修改為摘要)

[↓ 全文下載](#)

檢索策略

範例: 照顧一位遭受婚暴婦女之急診護理經驗

	檢索策略	進階查詢 (篇+關+摘)	首頁 (精確)
1	照顧一位遭受婚暴婦女之急診護理經驗	2	0
2	婚暴 AND 急診 AND 婦女 AND 護理	9	44
3	婚暴 AND 急診 AND 婦女	9	65
4	(婚暴 OR 婚姻暴力 OR 家暴 OR 家庭暴力 OR 伴侶暴力 OR 受暴 OR 受虐) AND 急診 AND (婦女 OR 女性)	45	649
5	(婚暴 OR 婚姻暴力 OR 家暴 OR 家庭暴力 OR 伴侶暴力 OR 受暴 OR 受虐) AND 急診	142	945



檢索策略

AND (婦女 OR 女性)

文章說拜拜!

運用Watson關懷理論照護一位婚姻暴力個案之急診護理經驗

劉思君(Sih-Jyun Liu) ; 呂沛晴(Pei-Ching Lu) ; 吳麗淑(Li-Shu Wu)

《若瑟醫護雜誌》 13卷1期 (2019 / 06) Pp. 75-87

) : 83-88. doi : 10.1097/MEJ. 0b013e328348a 9f2 8 黃貞觀、張維敦：婚姻暴力受害者對急診護理人員提供照護之看法與期待。亞洲家庭暴力與性保護因應能力、增加對婚姻暴力的認知、主動尋求社會資源，引導其學習正向因應行為來面對後續家庭、社會及心理的調適，進而擁有更佳的生活品質。建...

運用羅氏理論於一位外籍配偶遭受婚姻暴力之急診護理經驗

林玉湘(Yu-Xiang Lin) ; 陳姿伶(Tzu-Ling Chen) ; 胡怡君(Chiung-Jacky Chiu)

《源遠護理》 5卷1期 (2011 / 05) Pp. 76-84

(Boursnell & Prosser, 2010) ，急診病患中至少有6%是因家庭婚姻暴力而求醫 (Perisenhofe & Seibold, 2007; Olive, 2007) 。本文個、無望感的回饋結果，最後使得個案社會行為技巧提升並增加自我照顧與適應能力。關鍵詞：羅氏適應理論、新移民婦女、婚姻暴力。運用羅氏理論於一位...

照護一位外籍新娘遭受家庭暴力之急診護理經驗

吳碧月

《領導護理》 7卷2期 (2006 / 12) Pp. 55-64

本篇是描述一位25歲的越南籍新娘在2005年9月30日遭受家庭暴力，身體有多處擦傷及頭痛等不適，出現害怕、恐懼及哭泣等情形，在急診室時，藉由實際觀察、傾聽及隱密性的會談收集資料。期許個案在日常生活中能減少受虐的發生，藉由本個案報告提供護理同仁們處理面臨家庭暴力病人照護的參考價值。♀...

利用華藝蒐集中英同義詞

- 新版的中英書目在不會在檢索結果並列
- 必須點進詳細書目才能看到中英並列的摘要

中段尿

精確檢索：中段尿

模糊檢索：中段尿

Modified Clean-Catch Urine Study in Routine Adult Female Physical Examination

何邦立(Bang-Lee Ho)

《Journal of Medical Sciences》 1卷4期 (1976 / 12) Pp. 359-364

染，採取中段尿液；另外不加任何教導的為對照組，以測定中段取尿法的效果。同時訂定出，健康女性體檢時，尿液呈

Correlation Between Urinary and Serum Prostate - Specific Antigen

血清攝護腺特異抗原(PSA)是關於攝護腺應用最重要的腫瘤標記，但尿液中的PSA則很少被注意到。本研究在探討單次中段尿液，24小時尿液及血清PSA值的相關性。本研究共有98個病患，包括20個攝護腺癌(CaP)和78個良性攝護腺增生(BPH)病患(皆有病理證實)，前34例只測定早上第一次中段尿液，傍晚單次中段尿液及血清PSA值，其PSA值分別為 336 ± 223 , 443 ± 208 及 11.7 ± 4.4 ng/ml。另64例則測定24小時尿液及血清PSA值，其BPH及CaP患者的血清PSA值分別為 9.9 ± 1.6 及 25.7 ± 8.2 ng/ml，24小時尿液PSA值分別為 120 ± 20 及 72 ± 31 ng/ml，24小時尿

This study is conducted to clarify the correlation between serum and urinary prostate-specific antigen (PSA) and to find the difference in urinary PSA between patients with prostate cancer (CaP) and those with benign prostatic hyperplasia (BPH). PSA levels of 20 patients with prostatic cancer and 78 patients with BPH were determined using the ELSA-PSA2 kit. For the first 14 patients, the PSA of serum and first-voided urine in the morning were detected. For the following 20 patients, serum PSA, as well as morning and evening midstreamurinary PSA were examined. Serum PSA and 24-h urinary PSA were measured for the remaining